Análise Matemática II E – 2º Semestre 2019/20

Exame de Época 2 — 14 de Julho de 2020
(Duração 3h)

Parte I

1. No início de um exame tomográfico, um paciente recebeu 27 g de um determinado elemento químico, sob a forma de contraste endovenoso, por forma a melhor identificar as anomalias existentes.
  - (a) [0.5 val.] Recorrendo ao modelo de decaimento exponencial, modele matematicamente a situação descrita, definindo o problema de valor inicial que lhe corresponde.
  - (b) [0.5 val.] Determine a solução do problema de valor inicial definido na alínea anterior.
  - (c) [0.5 val.] Determine o tempo de meia-vida do elemento químico administrado, sabendo que ao fim de uma hora restavam apenas 26.9 g do mesmo.

2. [1.5 val.] Determine a família de soluções da equação diferencial ordinária de primeira ordem:

$$x^3 + x^3 y^4 = y y' e^{-x^2}$$

3. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, -2)\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = x(y + 2) \log(x^2 + (y + 2)^2) + x$$

- (a) [1.0 val.] Mostre que é possível prolongar f por continuidade a $(0, -2)$ e defina a respectiva função prolongamento, $\bar{f}$.
- (b) [1.5 val.] Mostre que $\bar{f}$ é diferenciável em $(0, -2)$.
- (c) [0.5 val.] Determine uma aproximação de primeira ordem ao valor de $\bar{f}(0.02, -1.999)$.

$\overrightarrow{v.s.f.f.}$

4. Seja $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ a função definida por

$$f(x, y) = (e^x \operatorname{arctg}(x + y), \log(x^2 + y^2) \cos(x^3 y)).$$

(a) [1.5 val.] Justifique que f é diferenciável em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ e calcule a respectiva matriz jacobiana.

(b) [1.0 val.] Considere ainda uma função $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$. Sabe-se que $\nabla g(1, 0) = [1 \ 2]^\top$ e que $\nabla g(\frac{e\pi}{4}, 0) = [-1 \ 3]^\top$. Justifique que $g \circ f$ é diferenciável em $(1, 0)$ e calcule $\nabla(g \circ f)(1, 0)$.

5. [1.5 val.] Sejam $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funções de classe $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$. Considere a mudança de variáveis definida por $x = u + v$ e $y = u - v$. Sabendo que $f(x, y) = g(u, v)$ e que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$, mostre que:

$$\frac{\partial^2 g}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} = 0$$

Parte II

6. Considere a equação

$$\operatorname{sen}\left(e^{x^3y} + 3z - 1\right) + \operatorname{arctg}(xz + y^2) = -1$$

(a) [1.0 val.] Mostre que esta equação define x como função implícita de y e z ($x = \phi(y, z)$) numa vizinhança de $(0, 0, \frac{\pi}{2})$. Justifique detalhadamente a sua resposta.

(b) [1.0 val.] Determine, justificando, $\phi'_{(3,-2)}(0, \frac{\pi}{2})$.

7. [1.5 val.] Uma caixa tem um dos seus vértices no ponto $(0, 0, 0)$ e todas as arestas paralelas aos eixos coordenados. Se o vértice diagonalmente oposto ao vértice localizado em $(0, 0, 0)$ pertencer ao primeiro octante e ao plano definido por $3x + 2y + z = 1$, qual a posição deste vértice que maximiza o volume da caixa?

8. Considere o domínio plano D , definido por

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9 \wedge y \leq x \wedge x \geq 1\}$$

(a) [1.5 val.] Usando coordenadas polares e recorrendo a um único integral duplo, represente o cálculo da área do domínio D .

(b) [1.0 val.] Determine o valor da área de D .

9. Considere o parabolóide de equação $z = x^2 + y^2$ e seja S o sólido definido por:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq x^2 + y^2 \wedge x^2 + y^2 + z^2 \leq 2\}$$

(a) [1.5 val.] Usando coordenadas esféricas, represente o volume do sólido S na forma de um único integral triplo.

(b) [1.0 val.] Calcule o volume de S .

10. [1.5 val.] Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável e considere $x_* \in \mathbb{R}^n$. Seja $\{v_1, \dots, v_m\}$ um conjunto de vectores de $\mathbb{R}^n$ tal que para cada $u \in \mathbb{R}^n$ existem reais não negativos $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ que satisfazem

$$u = \sum_{i=1}^m \alpha_i v_i.$$

Mostre que se

$$\nabla f(x_*)^\top v_i \geq 0, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

então x_* é um ponto estacionário de f .